

Infektioner hos barn

Hur smittan sprids, symptom, hur vi undviker smitta och hur länge barnet skall vara hemma i samband med sjukdom.

Se information från Vårdguiden, 1177 om infektioner hos barn:

<https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide/#section-17>

Följande länk gäller specifikt magsjuka och vinterkräksjuka.

<https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-krakningar/>

Generellt för att undvika vidare smitta i skolan är:

Att alla elever lär sig god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten inför intag av mat och efter toalett besök. Tvätt av händer ska även ske om man tror att man haft kontakt med någon eller något som kan föra smitta vidare.

Det är mycket viktigt att *alla barn stannar hemma då de är sjuka* och sedan *minst 1 dygn efter att de tillfrisknat*. Det krävs oftast mer av barnen i skolan än hemma och det är viktigt att de orkar vara i skolan och följa undervisningen.

Om de inte orkar följa med i undervisningen ska de stanna hemma,

Vid vinterkräksjuka rekommenderar vi på skolan att eleven är hemma 2 dygn efter tillfrisknande eller 48h efter senaste kräkning eller diarré, eftersom man vid vinterkräksjuka kan vara smittsam i upp till 3 dygn efter tillfrisknandet.

Detta för att undvika snabb spridning på skolan.

Skillnad mellan vanlig magsjuka och vinterkräksjuka är ofta det plötsliga och snabba insjuknandet som sker vid vinterkräksjuka.

Mvh

Skolhälsovården